

Förebyggande mot illamående (Steg 7, 3d)

Antiemetika

Schema för regimen

Dag	1	2	3	4	5	6
Netupitant, palonosetron (300/0,5)	X					
Betametason	X	X	X			
Betametason				X		
Betametason					X	
Olanzapin Kvällsdos	X	X	X	X	X	X

Om din behandling

Du ska ta förebyggande behandling för att minska risk för illamående i samband med din behandling. En del läkemedel minskar även risken för allergi som vissa behandlingar kan ge. Om du missat att ta din dos tala om det för din sjuksköterska. Det är viktigt att du noterar hur du mår för att vi ska kunna justera dosen av läkemedel.

Så ska du ta din behandling

Dag 1

Cirka 1-2 timmar före behandling

Akynzeo (netupitant/palonosetron) 300 mg/ 0,5 mg: 1 kapsel

Betapred (betametason) 0,5 mg: 16 tabletter (tabletterna löses i vatten)

Till natten

Olanzapin 2,5 mg: 2 tabletter.

Dag 2

Cirka 1-2 timmar före behandling

Betapred (betametason) 0,5 mg: 16 tabletter (tabletterna löses i vatten)

Till natten

Olanzapin 2,5 mg: 2 tabletter.

Dag 3

Cirka 1-2 timmar före behandling

Betapred (betametason) 0,5 mg: 16 tabletter (tabletterna löses i vatten)

Till natten

Olanzapin 2,5 mg: 2 tabletter.

Dag 4

På morgonen

Betapred (betametason) 0,5 mg: 8 tabletter (tabletterna löses i vatten)

Till natten

Olanzapin 2,5 mg: 2 tabletter.

Dag 5

På morgonen

Betapred (betametason) 0,5 mg: 4 tabletter (tabletterna löses i vatten)

Till natten

Olanzapin 2,5 mg: 2 tabletter.

Dag 6

Till natten

Olanzapin 2,5 mg 2 tabletter.

Vid behov, behandlingsdagar och ett par dagar efter

Olanzapin 2,5 mg. Vid behov kan man öka till högst fyra tabletter (10 mg) per dygn. Tas med fördel till natten eftersom läkemedlet ger trötthet.

Förebyggande läkemedel mot illamående

Du kan få läkemedlen av din sjuksköterska eller på recept.

Akynzeo (netupitant/ palonosetron)

Akynzeo (netupitant/ palonosetron) är en kombinerad behandling i en kapsel. Du kan få kapseln att ta hemma eller så får du den när du kommer till avdelningen. Dosen tas minst en timma före behandling. Effekten håller i sig i tre dygn. Det är vanligt att få förstoppning. Detta kan förebyggas med laxermedel. Informera vårdpersonalen före behandlingen om du har trög mage. Vanligt med huvudvärk. Detta kan behandlas med paracetamol. Yrsel och trötthet kan förekomma. Tänk på det om du ska köra bil.

Betapred

Betapred (betametason) är kortison. Tablettorna löses i lite vatten och lösningen sväljs. Dosen tas minst en timma före behandling. Skölj gärna munnen med vatten efter intag av betametason för att minska risken för munsvamp. Ta tablettorna tillsammans med mat.

Kortison används också för att minska risken för allergiska reaktioner som vissa cancerläkemedel kan ge. Kortison kan vara uppiggande och ge ansiktsrodnad.

Olanzapin

Olanzapin är ett läkemedel som används vid psykisk ohälsa men i låga doser har god effekt mot illamående, särskilt mot illamående som kan uppkomma dagar efter behandling.

Du kan bli trött av Olanzapin. Tröttheten kan minska uppmärksamhet vid tex bilkörning vilket kan göra det olämpligt att framföra motorfordon. Vi rekommenderar att ta dosen på kvällen, med första dos behandlingsdagens kväll.

Man ska ta högst 10 mg Olanzapin under en dag. Högre dos ger inte bättre effekt.

Illamåendedagbok

Registrera ditt mående och återkoppla till din sjuksköterska.

Namn:										Personnummer:			
Behandling:													
Kurnummer:										Startdatum:			
Datum dag 1:		Illamående			Kräkning		Matleda		Upplevt välbefinnande			Anteckningar	
		Inget	Lätt	Starkt	Ja	Nej	Ja	Nej	Bra	Dåligt	Mycket dåligt		
Dag 1	Kväll												
	Morgon												
Dag 2	Dag												
	Kväll												
Dag 3	Morgon												
	Dag												
Dag 4	Kväll												
	Morgon												
Dag 5	Dag												
	Kväll												
Dag 6	Morgon												
	Dag												
Dag 7	Kväll												
	Morgon												
Dag 8	Dag												
	Kväll												
Dag 9	Morgon												
	Dag												
Dag 10	Kväll												
	Morgon												