Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____

Yta (m^2): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-8425

Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation

Diagnoskod: C67

Kurintervall: 7 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg (standarddos)	x1							
Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation 37,5 mg (standarddos)	x1							

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Natriumbikarbonat tablett 2 X1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen för att minska irritativa besvär av Gemcitabin (surt pH 2,5).

Patienten informeras om att vara restriktiv med vätska på morgonen före instillation.

Efter blåstömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 90 min.

Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 90-120 min.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Premedicinering för Gemcitabin _____ .....
   (Två tabletter Natriumbikarbonat a´ 1 g intas kvällen före samt på morgonen före instillation.)

2. **Gemcitabin** _____ **mg** _____ _____
   Ges intravesikalt

3. **Docetaxel (vattenfri)** _____ **mg** _____ _____
   Ges intravesikalt