Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-7392

Gemcitabin intravesikal flerdosinstillation

Diagnoskod: C67
Kurintervall: 7 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Gemcitabin	Intravesikal instillation			1000 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
1. Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg	x1							

Behandlingsöversikt
En instillation per vecka i 6 veckor med behandlingsstart 2-4 veckor efter TURB (transuretral resektion).

Anvisningar för regimen

Anvisningar för ordination
Efter blåstömning instilleras Gemcitabin Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 2 timmar.

Vid irritativa besvär av Gemcitabin, som är surt (pH 2,5), kan tablett Natriumbikarbonat 1 g ordineras kvällen innan och på morgonen inför behandlingen.

Övrig information
Se basfakta.

Biverkningar

Gemcitabin

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt Urinvägspåverkan med dysuri (sveda, obehag eller smärta vid miktion) och frequency (täta trängningar) finns rapporterat. Grad 1-2, någon enstaka grad 3, ingen grad 4. Studierna är dock små. Vid kombination med Docetaxel beskrivs biverkningar öka i frekvens, se Docetaxel intravesikal instillation.		
Hematologisk toxicitet Fallrapport finns om neutropeni, grad 3. Liten studie. Vid kombination med Docetaxel intravesikal instillation finns ingen neutropeni rapporterad. Liten studie.		
Gastrointestinal påverkan Illamående ej rapporterat för Gemcitabin intravesikal instillation singelbehandling.		
Hudtoxicitet Rapport finns om enstaka hudpåverkan, ej beskrivet vad. Liten studie.		

Referenser

Addeo et al. Randomized phase III trial on gemcitabine versus mytomicin in recurrent superficial bladder cancer: evaluation of efficacy and tolerance. J Clin Oncol . 2010 Feb 1;28(4):543-8.

Versionsförändringar

Version 1.1
Lagt till patientformationen.

Version 1.0
Regimen fastställdes