

Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1320

Mitomycin intravesikal endosinstillation

Diagnoskod: C67

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusions-tid	Grunddos/admtillfälle	Beräk-ningsätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack. dos
1. Mitomycin	Intravesikal instillation			40 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Mitomycin Intravesikal instillation 40 mg	x1

Behandlingsöversikt

Instillationsbehandling utförs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

OBSERVERA att perforation i samband med TURB utgör en kontraindikation för postoperativ intravesikal endosinstillation.

Övrig information

Se basfakta.

Biverkningar

Mitomycin Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

Cystit

Biverkningskontroll

Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.

Hudtoxicitet

Biverkningskontroll

Antihistamin

Allergiska hudutslag, klåda, kontaktdermatit förekommer. Motverka genom sköljning av underliv alternativ tvätt med olja efter första miktion. Eventuellt behov symtomatisk behandling antihistamin, kortison.

Graviditetsvarning

Preventivmedel måste användas under och 6 mån efter avslutad behandling. Primärt syfte förhindra graviditet, då mitomycin kan medföra fosterskador. Risk för irreversibel infertilitet hos män. Överväg kontakt med fertilitetslaboratoriet.

Övrigt

Mitomycin är starkt basiskt. Ur miljöhänsyn bör därför neutralisering med syra ske efter första miktion i toalett i hemmet. Angiven mängd 5 ml ättika 24%, dvs om 1 msk 24% ättika används är det med råge uppfyllt. I sjukvården hantering enligt farligt avfall/spill, se vårdhandboken.