

Datum: \_\_\_\_\_  
 Läkare: \_\_\_\_\_  
 Kur nr: \_\_\_\_\_  
 Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
 Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Sarkom

RegimID: NRB-7445

**Trabektedin (Yondelis)**

Diagnoskod: C49

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Trabektedin Intravenös infusion 1,5 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1																					

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Central infart bör användas.

**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blod-, leverstatus (bilirubin, ALP, ASAT, ALAT) och CK (kreatininfosfokinas).

Premedicinering - Betametason 16 mg ges peroralt eller som intravenös injektion 30 minuter före start (är också leverskyddande).

*De två första kurena:* Kontroller en gång/vecka - blodstatus, albumin, elektrolytstatus och kreatinin.

Därefter enligt klinisk bedömning.

**Dosjustering rekommendation***Reduktion av första kuren* - Om tidigare högdos cytostatika (Ifosamid, Metotrexat eller med stamcellsstöd) eller strålbehandling till >25 % av benmärg - ge Trabektidin 1,0 mg/m<sup>2</sup>.*Följande kurer:*

Neutrofila &lt;1,5 och/eller TPK &lt;100 behandlingen skjuts upp en vecka.

Nadirvärden i &gt;5 dagar, neutrofila &lt;0,5 och/eller TPK &lt;25 - sänk dosen en nivå, se nedan.

Nadirvärden i &gt;3 dagar, neutrofila ≤ 0,1, sänk dosen en nivå.

Febril neutropeni (≥ 38 C och neutrofila ≤1,0) - sänk dosen en nivå.

Levervärden, bilirubin och ALP ≥2 - sänk dosen en nivå.

Levervärden, ALAT/ASAT ≥3 - sänk dosen en nivå.

*Dosnivåer*Nivå 0 - Trabektidin 1,5 mg/m<sup>2</sup>Nivå -1 - Trabektidin 1,2 mg/m<sup>2</sup>, motsvarar 80 % av nivå 0.Nivå -2 - Trabektidin 1,0 mg/m<sup>2</sup>, motsvarar 67 % av nivå 0.**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-4-1d/>

Obs! Undvik dubbel dos kortison. Om flera kortisondoser ingår (som premedicinering, antiemetikaregim eller ingående i regimen på annat sätt) välj den högsta av de olika doserna.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |  |  |         |       |       |
|--|--|---------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br><i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>                               |  |         | _____ | ..... |
| 2. Premedicinering för Trabektedin<br><i>(Ge Betametason 16 mg peroralt eller som iv injektion 30 minuter före Trabektedin.)</i> |  |         | _____ | ..... |
| 3. Tablett/Injektion Antiemetika<br>_____<br>_____   |  |         | _____ | ..... |
| 4. <b>Trabektedin</b> _____ mg<br>i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml<br>Ges intravenöst under 24 tim.                               |  | 24 tim. | _____ | _____ |